

!!! MYŚLIWI !!!

!!! ZAGROŻENIE AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWINI !!!

Jesteś myśliwym?

Poliąc zwierząt uwagę na zachowanie zwierząt dzikich, a w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w szczególności na zachowanie dzików!

Afrykański pomór świń to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, zakaźna i zarazliwa, wirusowa choroba świń domowych oraz dzików, podlegająca obowiązkowi urzędowego zwalczania.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF

Wystąpienie tej choroby powoduje poważne straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowlu - powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozykwiwanych od świń, a także padnictwami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby.

!!! Jesteś myśliwym hodującym świnie?!

Nie kuś losu, nie poluj !!!

Po zauważeniu u dzików chorobę, takich jak:

- zwiększone padnięcia;
- osłabienie, zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji, ograniczony odruch ucieczki;

- sinica skóry uszu, brzucha, i boków ciała, liczne wybroczyny na skórze;
- duszność, pienisty lub krusisty wypływy z nosa;
- biegunka, często z domieszką kruji;

- oraz, każdy przypadek znalezienia padłego dzika.

zgłaszać ten fakt do najbliższego powiatowego lekarza weterynarza!!

Zachowaj daleko idącą ostrożność w postępowaniu z odstrzelonym lub padłym dzikiem:

- nie patrossz padłego lub odstrzelonego dzika, który wykazywał objawy choroby w łowisku;

- unikaj patroszenia wszystkich odstrzelonych dzików w łowisku, staraj się jak najszybciej przewieźć je do punktu przerzyniania tusz odstrzelonych dzików;

- jeżeli patroszenie jest niezbędne wykonaj je na folii, lub innym szczelnym materiale;
- podczas każdego polowania używaj środka biobójczego do dezynfekcji miejsca patroszenia, a także miejsc zanieczyszczonych krują dzika (np. w trakcie przeciągania tuszy dzika do środka transportu itp.);
- umieszczaj patrochy i folię, na której dokonano patroszenia w szczelnym pojemniku lub worku;
- po wykonaniu wszystkich czynności na zwierzętach w łowisku zdezynfekuj sprzęt, którego używasz do tego celu, zdezynfekuj koła środka transportu, dłonie, obuwie, itp.

Zwróć szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie środka transportu używanego po przewozienia odstrzelonych dzików, a mianowicie:

- środek transportu powinien być szczelny, wyłożony materiałem łatwym do czyszczenia i dezynfekcji;
- nie powinien być używany w działalności związanej z utrzymaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;

MYŚLIWY

PAMIĘTAJ!!


Podejrzewasz ASF ?

**znalazłeś padłego
dzika ?**

ZADZWOŃ!

*Kraj, w którym wystąpi
ASF narażony jest na
bardzo duże straty
ekonomiczne w przemyśle
mięsnym oraz hodowli,
powodowane
wstrzymaniem obrotu
i eksportu świń, mięsa
wieprzowego oraz
produktów
pozyskiwanych od świń,
a także padnięciami świń
i kosztami likwidacji
ognisk choroby.*

INFORMACJA DLA MYŚLIWYCH AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ



Inspekcja Weterynaryjna